




吃藥別騎車
當心釀成悲劇！

吃藥別騎車，當心釀成悲劇！

2 / 3

服用某些藥物可能會引發以下症狀：

- 嗜睡
- 專注力與判斷力下降
- 反應遲鈍
- 眩暈
- 疲勞
- 視力模糊



這些症狀可能影響您的駕駛能力，
甚至引發交通事故



吃藥別騎車，當心釀成悲劇！

3 / 3

提醒您：

- 購買藥品或看醫生時，應詢問是否會影響駕駛，勿自行判斷。
- 駕駛前應避免服用引發上述症狀的藥品。
若無法避免，應請教醫師或藥師，選擇較不影響駕駛安全的藥品替代。






**Do not ride a motorbike
after taking medication
to avoid causing an accident**

Do not ride a motorbike after taking medication to avoid causing an accident

2 / 3

**Certain medications
can have the following side effects:**

- **Drowsiness**
- **Slower reaction time**
- **Diminished concentration and impaired judgment**
- **Dizziness**
- **Fatigue**
- **Blurred vision**



**These side effects can impact
your ability to drive safely
and could lead to an accident**



Do not ride a motorbike after taking medication to avoid causing an accident

3 / 3

Remember:

- When buying medication or seeing a doctor **ask** if the medicine could impact your ability to drive safely, do not make the decision on your own.
 - Avoid taking medication that could have the above side effects before driving.
- If medication has to be taken ask the doctor or pharmacist **to prescribe medicine that is less likely to impact your ability to drive safely.**






Tidak Mengendarai Motor Setelah Minum Obat Waspada Terjadi Tragedi!

Tidak Mengendarai Motor Setelah Minum Obat Waspada Terjadi Tragedi!

2 / 3

Mengasup beberapa obat tertentu
mungkin dapat menimbulkan gejala berikut:

- Mengantuk
- Penurunan daya konsentrasi dan penilaian
- Kelelahan
- Reaksi lamban
- Pusing
- Penglihatan kabur



Gejala-gejala ini mungkin memengaruhi kemampuan
Anda dalam mengemudi kendaraan,
bahkan mungkin dapat menyebabkan
kecelakaan lalu lintas



Tidak Mengendarai Motor Setelah Minum Obat Waspada Terjadi Tragedi!

3 / 3

Mengingatkan Anda:

- Saat membeli obat atau berobat ke dokter, **harus menanyakan apakah obat tersebut akan memengaruhi kemampuan mengemudi, jangan menilainya sendiri**
- Sebelum mengemudi, hindari untuk mengasup obat yang dapat menimbulkan gejala tersebut di atas. Jika tidak dapat menghindarinya, maka harus meminta dokter atau apoteker untuk memberikan obat pengganti yang tidak memengaruhi keamanan mengemudi kendaraan.






**Không nên lái xe
sau khi uống thuốc**
Hãy cẩn thận kéo gây ra thảm kịch!

Không nên lái xe sau khi uống thuốc Hãy cẩn thận kéo gây ra thảm kịch!

2 / 3

Uống một số loại thuốc
có thể gây ra các triệu chứng sau:

- Ngủ gà
- Giảm khả năng tập trung và phán đoán
- Mệt mỏi
- Phản ứng chậm
- Chóng mặt
- Nhìn mờ



Những triệu chứng này
có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe
và thậm chí gây ra tai nạn giao thông



Không nên lái xe sau khi uống thuốc Hãy cẩn thận kéo gây ra thảm kịch!

3 / 3

Nhắc nhở bạn:

- Khi mua thuốc hoặc đi khám bác sĩ, hãy hỏi xem thuốc có ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn không, đừng tự đưa ra phán đoán.
- Tránh uống các loại thuốc có thể gây ra các triệu chứng trên trước khi lái xe.
Nếu không thể tránh khỏi, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để lựa chọn loại thuốc thay thế ít có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn khi lái xe.






อย่าขับขี่หลังกินยา
ระวังเกิดโศกนาฏกรรม!

อย่าขับขีหลังกินยา ระวังเกิดโศกนาฏกรรม!

2 / 3

การใช้อยาบางชนิดอาจทำ
ให้เกิดอาการต่อไปนี้

- ง่วงนอน
- สมาธิและการตัดสินใจ
เชื่องช้า
- เหนื่อยล้า
- ตอบสนองช้าลง
- เวียนศีรษะ
- มองเห็นไม่ชัด



อาการเหล่านี้

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่ของคุณ
และอาจนำไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนน



อย่าขับขีหลังกินยา ระวังเกิดโศกนาฏกรรม!

3 / 3

คำเตือน

- เมื่อซื้อยา หรือพบแพทย์ ควรถามว่ายาจะมีผลต่อการขับขีหรือไม่ อย่าตัดสินใจเอง
- ก่อนขับขีควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่อาจทำให้เกิดอาการดังกล่าว หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเลือกยาทดแทนที่ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี

