

認識麻疹減麻煩

近期東南亞多國麻疹疫情升溫，臺灣也出現相關境外移入案例，提醒您留意自身健康狀況。

一·麻疹特性一·

高傳染力

多重傳染途徑

(空氣、飛沫及接觸傳染)

有潛伏期

(平均為14天)

一·常見症狀一·

發燒

紅疹

結膜炎

咳嗽

鼻炎

若您有相關症狀，請務必配戴口罩儘速就醫，並告知醫護人員您的旅遊接觸史！



Understanding measles

Recently, there has been an increase in cases of measles in countries across Southeast Asia and imported cases in Taiwan. The Ministry of Labor urges foreign workers to pay attention to their health.

Measles characteristics

Highly contagious

Multiple routes of infection
(can be transmitted by air, droplets and contact)

Average incubation period of 14 days

Common symptoms

Fever

Rash

Conjunctivitis

Cough

Rhinitis

If you develop related symptoms please wear a face mask, seek immediate medical attention and tell medical personnel your travel and contact history.



Mengenali Penyakit Campak dan Kurangi Permasalahan

Epidemi campak di banyak negara Asia Tenggara kembali meningkat belakangan ini, Taiwan sendiri juga muncul kasus yang terbawa dari luar, Anda diingatkan untuk memperhatikan kesehatan diri.

Sifat Campak

Daya penularan kuat

Berbagai ragam saluran penularan
(penularan melalui udara, droplet dan kontak langsung)

Ada masa inkubasi
(rata-rata 14 hari)

Gejala umum

Demam

Ruam

Konjungtivitis

Batuk

Rinitis

Jika Anda memiliki gejala terkait, harap segera mencari pertolongan medis dengan menggunakan masker, dan memberitahu petugas medis riwayat perjalanan dan kontak Anda!



Nhận biết bệnh sởi, giảm bớt ưu phiền

Thời gian gần đây dịch sởi ở nhiều quốc gia Đông Nam Á tăng mạnh, Đài Loan cũng xuất hiện những ca bệnh lây nhiễm từ nước ngoài, mọi người hãy chú ý tình trạng sức khỏe của bản thân.

Đặc tính của bệnh sởi

Lây lan mạnh

Lây nhiễm qua nhiều đường
(không khí, nước bọt và tiếp xúc)

Có thời gian ủ bệnh
(trung bình 14 ngày)

Triệu chứng thường gặp

Sốt

Ban đỏ

Viêm kết mạc

Ho

Viêm mũi

Nếu bạn có các triệu chứng liên quan, vui lòng đeo khẩu trang và nhanh chóng đi khám bệnh, đồng thời thông báo cho nhân viên y tế về lịch sử tiếp xúc, lịch sử du lịch của bạn!



รู้จักโรคหัดลดความกังวล

ช่วงนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคหัด ซึ่งไต้หวันก็พบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ จึงขอเตือนประชาชนให้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตน

— ลักษณะของโรคหัด —

ติดต่อได้ง่ายและแพร่เชื้อ
รวดเร็ว

ติดต่อได้หลายทาง
(ทางอากาศ ทางสัมผัสฝัสดละออง
น้ำลาย น้ำมูก)

มีระยะฟักตัว
(ประมาณ 14 วัน)

— อาการที่พบบ่อย —

เป็นไข้

ผื่นขึ้น

เยื่อบุตาอักเสบ

ไอ

คัดจมูก

หากมีอาการข้างต้น โปรดสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ประวัติการสัมผัสโดยละเอียด

